

ワクチン接種実施中

CONTENTS

- 新型コロナウイルス関連情報…………… 2
- クローズアップ市政…………… 4
- 災害に備える…………… 6
- 総社市出身選手が世界の舞台へ…………… 8
- お知らせ…………… 10
- フォトニュース…………… 23

2021
令和3年
No. 195

7




令和3年7月号
令和3年7月1日発行

No. 195

発行／総社市役所 編集／市政情報課広報広聴係
電話 0866(92) 8214 Eメール shisei@city.soja.okayama.jp
〒719-1192 岡山県総社市中央一丁目1番1号

配布／総務課行政係
電話 0866 (92) 8218 FAX 0866 (93) 9479
総社市役所のホームページ <https://www.city.soga.okayama.jp>



問い合わせ 新型コロナウイルス感染症対策室
(☎⁹² 8278)

// 冷凍庫にて低温で保管 //

ファイザー社のワクチンは、-75 度前後の超低温冷凍庫（ディープフリーザー）で保管されています。武田／モデルナ社のワクチンは、-20 度前後で冷凍保存します。

各医療機関へは週1回、市職員が輸送。保冷バッグに入れて必要数を届け、到着後は2～8度の冷蔵庫で保管されます。

冷凍庫から取り出した後の冷蔵保存期限は、ファイザー社製が1カ月後、武田／モデルナ社製が30日後です。



テイラーフリーサー



// 接種の間隔は 3 ~ 4 週間 //

ファイザー社のワクチンは通常、3 週間の間隔で2 回接種します。最も高い発症予防効果を得られるのは、2 回目接種後7 日程度たって以降で、有効性は約 95%とされています。

武田／モデルナ社のワクチンは通常、4 週間の間隔で2 回接種します。臨床試験において、十分な免疫が獲得されたのは2 回目接種後 14 日以降で、有効性は約 94%とされています。

// 筋肉内に直接注射 //

日本で一般的な皮下注射は、皮膚と筋肉の間にある皮下組織に注射する方法です。筋肉注射

は、皮下脂肪の奥にある筋肉内に直接注射する方法で、新型コロナウイルスのワクチンは肩の筋肉（三角筋）に注射します。

筋肉は、皮膚と比べて痛みを感じる神経が少ないとされています。



// 副反応が生じることがある //

接種後に、注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などがみられることがあります。こうした症状のほとんどは、数日以内に回復します。

また、まれな頻度でアナフィラキシー（急性アレルギー反応）が起きます。もしアナフィラキシーが起きても、接種会場や医療機関ですぐに処置が行われます。

▼このほか、新型コロナウイルスワクチンについての情報は、厚生労働省ホームページに掲載されています



QRコード”

編集後記

■自転車通勤にも慣れたきた
 ころです。通勤以外にも使っ
 てきたいです。(Y・A)

■気温や湿度が上がり、暑苦し
 い季節になってきました。エア
 コンに頼りすぎず、夏を乗り切
 りたいと思います。(Y・Y)

■マスク焼け・マスク越し焼け
 に気を付けます。(I・A)

■歯の手入れが気になる年頃にな
 り、就寝前の歯磨きが非常に
 長くなりました。(O・H)

$$\begin{pmatrix} 0 \\ \cdot \\ H \end{pmatrix}$$

1

今月の表紙



5月17日から、65歳以上を対象にした新型コロナウイルスのワクチン接種が始まりました。総合福祉センターと昭和公民館を会場にした集団接種と、各医療機関での個別接種が行われています。

65歳以上の市民にも接種開始
感染拡大を防ぎ安全を守る